



تعليم اداري رقم (٩٠) لسنة ٢٠١٢

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
السادة الأفاضل / مدراء الصيدليات الخاصة

الموضوع : السلامة الدوائية للمنتجات الحاوية على Codeine

لبعض الأطفال بعد استئصال اللوزتين أو اللحمية

نود أن نلفت انتباهم بأن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيرا بشأن استخدام المادة المذكورة أعلاه لبعض الأطفال بعد استئصال اللوزتين أو اللحمية، حيث قد تسبب في حدوث مضاعفات خطيرة كالصعوبة في التنفس أو الوفاة في الأطفال الذين لديهم قدرة وراثية لتحويل الكربين إلى جر عات عالية من المورفين في الجسم.

وعليه توصي وزارة الصحة التالي:

- على ممارسي الرعاية الصحيةأخذ الحيطه والحذر عند وصف الكوديين للأطفال الذين خضعوا لاستقبال اللوزتين و / أو اللحميه .
 - ينبغي وصف **Codeine** لفترات قصيرة وبأقل جرعة، وعند الحاجة فقط للأطفال.
 - يجب على الوالدين التوقف عن إعطاء **Codeine** للأطفال والتواصل مع أطبائهم عند ظهور علامات الجرعة الزائدة للمورفين كالنعاس الغير اعيادي، والارتباك، أو صعوبة في التنفس للحصول على الرعاية المناسبة .

وفي حال حدوث أي اعراض جانبية يرجى ملي الإستماراة الخاصة بالأثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الوصلة <http://www.cpd-pharma.ae> .

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الاستمار الخاصة بالأثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الوصلة <http://www.cpd-pharma.ae>.

أو الاتصال على العنوانين التاليين:

هاتف: 6117391 - 6117642 أو 02-6313742 أو البريد الإلكتروني pv@moh.gov.ae أو البريد الإلكتروني al-khtor@moh.gov.ae
ان هذا التحذير موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية لتابعته من ضاهم .

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص

