



التاريخ: ٢٠١٢/٣/٢٣

تصميم إداري رقم (٣٦) لسنة 2012

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل/ مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
السادة الأفاضل/ مدراء الصيدليات الخاصة  
المحترمين  
المحترمين  
المحترمين

م/التفاعل الدوائي بين أدوية ستاتين (Statins) والأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص

المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي (HIV or Hepatitis C)

نود أن نلفت انتباهكم الى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحديداً لتوصياتها بشأن استخدام أدوية ستاتين بالتزامن مع مثبطات الأنزيم البروتيني والأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي ج (HIV or Hepatitis C) وذلك بسبب خطر الإصابة بتلف في العضلات (Myopathy) و (rhabdomyolysis) والتي تؤدي الى فشل كلوي الذي قد يؤدي الى الوفاة. وعليه توصي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بوزارة الصحة بممارسي الرعاية بأخذ الحيطة والحذر عند استخدام أدوية نقص المناعة البشرية أو أدوية التهاب الكبد الوبائي ج HCV بالتزامن مع أدوية ستاتين. موانع استخدام أدوية ستاتين مع الأدوية الأخرى مرفقة مع التعميم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملى الإستشارة الخاصة بالأثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الوصلة <http://www.cpd-pharma.ae> والمرفق بهذا التعميم.

في حالة وجود أي استفسار أو تعرضك لأي أعراض جانبية للأدوية، يرجى إبلاغ إدارة السجل والرقابة الدوائية على:

هاتف: 6117391 - 02 أو 6117318 - 02 أو فاكس: 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

إن هذا التحذير موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية لتابعة مرضاهم.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص



المحترم  
المحترم

قسم النظم الدوائية والمعلومات الدوائية والمصنوع  
نسخة لكل من:  
معالي / وزير الصحة  
سعادة / وكيل وزارة الصحة  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية  
سعادة / المدير العام لوزارة البيئة والمياه  
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي  
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي  
سعادة / المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس  
سعادة / المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية  
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
سعادة / مدير الأندية والصحة/قسم البيئة والصحة دبي  
سعادة / مدير إدارة الإعلانات الصحية  
سعادة / مديرة إدارة التسجيل والرقابة الدوائية  
سعادة / رئيس اللجنة المركزية لإدارة الإمداد والتزويد الطبي



موانع استخدام أدوية ستاتين مع الأدوية الأخرى:

Statin	Interacting protease inhibitor(s)	Prescribing recommendation
Atorvastatin	• Tipranavir + ritonavir • Telaprevir	Avoid atorvastatin
	• Lopinavir + ritonavir	Use with caution and use with the lowest atorvastatin dose necessary
	• Darunavir + ritonavir • Fosamprenavir • Fosamprenavir + ritonavir • Saquinavir + ritonavir	Do not exceed 20 mg atorvastatin daily
	• Nelfinavir	Do not exceed 40 mg atorvastatin daily
Fluvastatin		No data available
Lovastatin	• HIV protease inhibitors • Boceprevir • Telaprevir	Contraindicated
Pitavastatin	• Atazanavir ± ritonavir • Darunavir + ritonavir • Lopinavir + ritonavir	No dose limitations
Pravastatin	• Darunavir + ritonavir • Lopinavir + ritonavir	No dose limitations
Rosuvastatin	• Atazanavir ± ritonavir • Lopinavir + ritonavir	Limit rosuvastatin dose to 10 mg once daily
Simvastatin	• HIV protease inhibitors • Boceprevir • Telaprevir	Contraindicated